

# Enucleatio bulbi bij het paard

Dierenarts Maurits Bosgoed legt uit hoe hij probeert het oog van een veulen te redden.



Het beschadigde oog na een trap van een stalgenoot

De infuusslang voor de zalf-toevoer

Het 'oog' na het verwijderen van de oogbol

De wond is volledig tot rust gekomen en genezen

Op een dag werd ik gebeld om bij een veulen te komen kijken, die een ontstoken oog zou hebben. Het veulen was een halfjaar oud en liep in een groep van ongeveer tien leeftijdsgenoten. Het had inderdaad een flink ontstoken oog. Het wakkere veulen benaderen was al lastig, dus het goed inspecteren van het oog al helemaal. Wat niet goed lukt bij het wakkere dier, moet onder narcose. Zo gezegd zo gedaan. Met het veulen onder narcose kon ik een goede inspectie doen. Er bleek er geen sprake te zijn van een gewone oogontsteking, maar een flinke beschadiging aan het ooglid en de oogbol zelf.

Bij het liggende veulen werd het ooglid meteen gehecht. De prognose voor het oog zelf leek ongunstig. Hij zou mogelijk nooit meer met dat oog zien. Ik koos ervoor eerst de ontsteking onder controle te krijgen, om daarna een definitieve prognose te kunnen geven.

De ontsteking werd met antibioticum-zalf behandeld. Het zalven van een al pijnlijk oog bij een niet al te tam paard is erg moeilijk en zal alleen maar moeilijker worden in de loop van de therapie. Zodra je al naar het oog wijst, doet het dier er al alles aan gedaan om te zorgen dat je er niet bij in de buurt kan komen. Hier bestaat een oplossing voor: er moet immers wel antibiotica in het oog. Wederom onder sedatie bracht ik een infuusslangetje aan dat naar het oog geleidt. Het slangetje loopt vanaf de hals richting het oog. Bij het oog gaat hij door het bovenste ooglid heen de conjunctivaalzak in en een centimeter verderop via het ooglid weer naar buiten. Door oogzalf in de

hals in het beginstuk te spuiten stroomt er zalf in het oog. Op deze manier is het veel makkelijker de zalf in het oog te brengen.

Na een ruime week was de ontsteking onder controle en kon ik weer een ooginspectie uitvoeren. De oogbol bleek zeer klein, en de voorste oogkamer helemaal leeg, wat betekende dat het oog volledig kapot was. Het stond nu vast dat er met dit oog nooit meer gezien zou kunnen worden. Voor de eigenaar, een grote paardenfokker, was het niet meer interessant dit hengstje aan te houden, ondanks de goede afstamming. Het leek me jammer dit veulen hierom bij de slager te laten eindigen, dus ging ik uitkijken naar een nieuwe eigenaar. Een assistente van onze praktijk had er wel oren naar het dier te adopteren, dus gin-

gen we door met de volgende stap van de behandeling: het verwijderen van het oog. Onder algehele narcose en met lokale pijnstilling kon ik de operatie uitvoeren en de totale oogbol en een deel van de oogleden verwijderen. De wond hechtte ik geheel dicht. Op de plek waar het oog zat, kon geen antibioticum meer worden aangebracht. Daarom brachten we dit in het lichaam zelf toe in combinatie met een goede pijnstilling voor de komende dagen.

De wond herstelde zich spoedig en na 10 dagen werden de hechtingen verwijderd. Het jonge paard redt zich uitstekend met één oog en nu is het belangrijk het vertrouwen weer terug te winnen zodat de nieuwe eigenaar er straks een leuk paard aan heeft!



Maurits Bosgoed Dierenarts in Vaassen (Gld.)